

Лекарственная форма 200 мг Порошок для приготовления раствора для внутривенного вливания
АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ: Вориконазол
ТОВАРНАЯ ФОРМА 1 флакон/коробка

Терапевтические показания:

VORIX — это триазольный противогрибковый препарат широкого спектра действия, который показан для лечения следующих грибковых инфекций:

Лечение инвазивного аспергиллеза,

Лечение кандидемии у пациентов без нейтропении,

Лечение серьезных инфекций *Candida*, включая *C. krusei* и эзофагеальные и системные инфекции *Candida* (гепатолиенальный кандидоз, общий кандидоз, кандидемия). Лечение серьезных грибковых инфекций, вызванных *Scedosporium* spp. (*S. apiospermum* и *S. prolificans*) и *Fusarium* spp.,

Лечение других серьезных грибковых инфекций у пациентов, рефрактерных к другим лекарственным препаратам, непереносящих их или не реагирующих на них (*Aspergillus* spp., *C. albicans*, non *Albicans* spp. [*C. krusei* и *C. glabrata*], *S. apiospermum*, *S. prolificans* и *Fusarium* spp.).

Образцы для грибковой культуры и других соответствующих лабораторных исследований (серология, гистопатология) должны быть получены для изоляции и идентификации возбудителей до начала терапии. Терапия может быть начата до того, как станут известны результаты культур и других лабораторных исследований; однако, как только эти результаты станут доступны, противoinфекционная терапия должна быть скорректирована соответствующим образом.

Препарат Ворикс для инъекций 200 мг (вориконазол) действует путем замедления роста грибов, вызывающих инфекцию.

Основные и второстепенные побочные эффекты препарата

Повышенная чувствительность глаз к солнечному свету тяжелая

Кожная сыпь сильная

Боль в животе сильная

Судороги сильные

Головокружение сильное

Повышенная жажда сильная

Желтизна глаз или кожи сильная

Мышечная боль сильная

Раздражительность сильная

Тяжелый солнечный ожог тяжелый

Диарея

Головная боль

Для чего его назначают?

Инвазивный аспергиллез

Это лекарство используется для лечения инфекций легких или иммунной системы, вызванных штаммом грибка *Aspergillus*.

Кандидоз пищевода. Это лекарство используется для лечения инфекций горла, вызванных штаммом грибка *Candida*.

Кандидемия Это лекарство применяется при лечении инфекций крови, вызванных штаммом грибка *Candida*.

Грибковая пневмония Это лекарство используется для лечения инфекций легких, вызванных штаммами грибов *Histoplasma capsulatum* и *Candida*.

Фузариоз. Этот препарат применяется для лечения инфекций, поражающих пациентов с ослабленным иммунитетом, вызванных штаммом грибка *Fusarium*.

Начало действия

Максимальный эффект этого препарата можно наблюдать через 1–2 часа.

Продолжительность эффекта

Действие этого препарата длится в среднем 6 часов.

Безопасно ли употреблять алкоголь?

Взаимодействие с алкоголем неизвестно. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Вызывает ли это привыкание?

Никаких тенденций к формированию привыкания не выявлено.

Использование во время беременности?

Это лекарство не рекомендуется беременным женщинам, если в этом нет явной необходимости. Проконсультируйтесь с врачом относительно потенциальных преимуществ и рисков перед приемом этого лекарства.

Использование во время кормления грудью?

Недостаточно информации о том, выделяется ли это лекарство с грудным молоком. Прекратите грудное вскармливание, если необходимо принимать это лекарство. Проконсультируйтесь с врачом относительно потенциальных преимуществ и рисков перед приемом этого лекарства.

Аллергия

Это лекарство не рекомендуется использовать, если у вас есть известная аллергия на это лекарство.

Препараты, удлиняющие интервал QT

Это лекарство не рекомендуется применять одновременно с препаратами, которые, как известно, вызывают специфические изменения сердечного ритма.

Предупреждения для особых категорий населения

Беременность

Это лекарство не рекомендуется беременным женщинам, если в этом нет явной необходимости. Проконсультируйтесь с врачом относительно потенциальных преимуществ и рисков перед приемом этого лекарства.

Кормление грудью

Недостаточно информации о том, выделяется ли это лекарство с грудным молоком. Прекратите грудное вскармливание, если необходимо принимать это лекарство. Проконсультируйтесь с врачом относительно потенциальных преимуществ и рисков перед приемом этого лекарства.

Общие предупреждения

Повреждение печени

Это лекарство может повысить уровень печеночных ферментов и вызвать гепатит и желтуху. В начале лечения необходим тщательный мониторинг функции печени (с помощью тестов). Прекратите прием лекарства, если симптомы ухудшатся.

Визуальные нарушения

Это лекарство может вызвать нарушения зрения, такие как неврит зрительного нерва и отек диска зрительного нерва. Необходим тщательный мониторинг зрительной функции, если лечение продолжается более 28 дней.

Аритмия и удлинение интервала QT

Это лекарство может вызвать аритмию и удлинение интервала QT, особенно у пациентов с имеющимися заболеваниями сердца. Необходим тщательный мониторинг функции сердца. Не используйте лекарства, которые могут увеличить риск аритмии.

Нарушение функции почек

Использование внутривенной инъекции Vorix 200 мг (вориконазола) не рекомендуется у пациентов с умеренным или тяжелым поражением почек (уровень клиренса креатинина < 50 мл/мин) из-за риска накопления. Пероральные лекарственные формы могут быть рассмотрены после оценки преимуществ и рисков.

Мониторинг функции поджелудочной железы

Это лекарство может увеличить риск панкреатита у пациентов, которые недавно прошли химиотерапию или трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Необходимо тщательное наблюдение за функционированием поджелудочной железы.

Кожные реакции

Это лекарство может вызвать серьезные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона или фотосенсибилизация кожи. Необходимо тщательное наблюдение за кожными реакциями. Избегайте воздействия солнечного света, надевая защитную одежду и используя солнцезащитный крем с высоким фактором защиты от солнца (SPF).

Детская популяция

Безопасность и эффективность препарата Ворикс для инъекций 200 мг (вориконазол) у пациентов младше 2 лет не установлены.

Пропущенная доза

Пропущенную дозу можно принять, как только вспомните. Если пришло время следующей дозы, то пропущенную дозу можно пропустить.

Передозировка

Немедленно сообщите врачу, если у вас появились симптомы передозировки.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Алпразолам тяжелый

Цизаприд тяжелый

Клопидогрель тяжелая

Варфарин умеренный

Аторвастатин тяжелый

Взаимодействие болезней

тяжелый Это лекарство следует назначать с осторожностью, если вы страдаете от нарушения функции печени. В таких случаях необходима соответствующая корректировка дозировки и мониторинг безопасности.

Умеренный Это лекарство следует назначать с осторожностью, если у вас есть какие-либо уже существующие заболевания сердца. В таких случаях рекомендуется соответствующая корректировка дозировки и мониторинг безопасности.

умеренный Требуется соответствующая корректировка дозировки в зависимости от степени нарушения функции почек. Если пациент находится на гемодиализе, то уровень этого лекарства в крови следует контролировать после каждого сеанса, а затем вводить скорректированную дозу.

Взаимодействие с продуктами питания

Принимайте это лекарство как минимум за 1 час до или после еды для лучшего усвоения.

Это лекарство следует принимать, следуя всем указаниям врача. Чтобы обеспечить полное выздоровление и отсутствие рецидива, следует пройти полный курс лечения. Оно более эффективно, если принимать его в одно и то же время во все дни. О любых случаях побочных эффектов следует немедленно сообщать врачу.

Принимать натощак.

Принимать по назначению врача.

Может вызывать сонливость